



Troubles urinaires et gynécologiques dans la paralysie cérébrale

P Gallien, A Duruflé, B Nicolas,
A Colin

Réseau Breizh PC

[Méthodologie]

- Etude à partir des dossiers patients du réseau Breizh PC
- Questionnaires adressés à tous les patients de la base
- Portant sur les troubles urinaires gynécologiques et leurs prises en charge

[Population]

- 182 réponses


- 92 hommes

- 90 femmes

- Age moyen 38,2 +/- 12 $\xrightarrow{19}$ 75

- Hommes 37,4 +/- 11,5 $\xrightarrow{20}$ 61

- Femmes 39 +/- 12 $\xrightarrow{19}$ 75

- 
- 58 vivent à leur domicile dont 17 en couple
 - 13 femmes et 4 hommes
 - 5 sont séparés
 - 1 veuf
 - 36 au domicile de leurs parents
 - 86 en institution dont 1 en maison de retraite

Handicap moteur

- 36 marchants avec ou sans aides techniques
- 105 utilisateurs de fauteuils roulants manuels
- 73 utilisateurs de fauteuils roulants électriques

[Troubles urinaires]

Présence de troubles urinaires

- 93 personnes dont
 - 46 hommes
 - 47 femmes

- Incontinence déclarée pour 102 ...



- Pollakiurie
 - Diurne : 12
 - Nocturne: 18
- Dysurie : 35
 - 20 hommes
 - 15 femmes (NS)
- Incontinence :
102 personnes

Incontinence

- 60 femmes, 42 hommes ($P=0,0075$)
 - Quotidienne: 42
 - Plusieurs fois par semaine : 12
 - Au moins une fois par semaine: 16
 - Au moins une fois par mois : 25
- Dans 50 % des cas incontinence secondaire

[Incontinence]

- 77 personnes portent des protections dont 49 en permanence

[Infections urinaires]

- 29 personnes
 - 9 hommes,
 - 20 femmes ($p=0,0097$)
- Le plus souvent fébrile 1,9 en moyenne par an sur les deux dernières années

[Prise en charge]

- Consultation pour 72 personnes (70%)
 - Médecin MPR : 32,
 - Urologue : 21,
 - Médecin généraliste : 27

[Types d'examens proposés]

- Echographie : 40
- Bilan urodynamique : 33
- Aucun examen: 24
- Scanner: 19
- UIV: 6
- Scintigraphie: 6
- Cystoscopie: 6

[Traitements]

- Dans 29 cas ...
 - Avec bénéfice pour 18
- Et 77 avec des protections...

[Suivi et problèmes gynécologiques]

- 57 femmes ont bénéficié d'un suivi (63%), dont 72% au moins une fois par an = 46% de la population totale)
- Le plus souvent par un spécialiste

Difficultés rencontrées lors de la consultation

63% :

- Positionnement sur la table 30/57
- Maintien sur la table 24/57
- Déshabillage 21/57
- Communication 19/57
- Intimité 14/57
- Accessibilité 7/57
- Satisfaction vis-à-vis du suivi: 68 % (39)

[Prévention]


- Vaccination contre le papilloma virus: 2
- Frottis de dépistage 37 /81, de façon régulière pour 27 femmes
- Mammographie: 26 femmes

[Raisons de l'absence de suivi]

- Pas besoin: 14/26
- Peur, crainte: 3/26
- Du fait du handicap: 3/26
- Accès au spécialiste : 4/26

[Problèmes spécifiques]

- Règles (86 personnes):
 - Normales: 34
 - Absentes : 16
 - Douloureuses : 24
 - Très rapprochées : 4
 - Avec céphalées: 11
 - Très abondantes: 15
 - Très espacées : 2

- 
- Problèmes en dehors des règles: 23
 - Douleur au niveau bas ventre: 8
 - Pertes blanches : 19
 - Inconfort au niveau de la vulve: 8

Grossesse et contraception

- 10 grossesses

Contraception

- Pilule : 10 personnes
- Autres moyens : 7 personnes
 - Stérilet : 3
 - Implant : 3
 - Ligature de trompe : 1

[Au total]

- Suivi probablement insuffisant