

# Sclérose en plaques

## Traitement par OCREVUS<sup>®</sup>

### (Ocrelizumab – ROCHE)

Disponible en France depuis 2019



Cette plaquette a été réalisée par la filière SEP de



## Dans quel cas OCREVUS® est-il utilisé ?

---

L'Ocrévus® est utilisé pour le traitement des patients adultes atteints de **formes actives de sclérose en plaques récurrente** (SEP-RR).

## Comment agit-il ?

---

L'Ocrévus® est un **anticorps monoclonal** qui cible et élimine un type de globules blancs : **les lymphocytes B** exprimant le récepteur CD20. En se fixant à ces lymphocytes B spécifiques, l'Ocrévus® entraîne une réduction de leur nombre et de leur fonction, ce qui permet de :

- Réduire l'inflammation et la dégradation de la gaine de myéline,
- Diminuer le risque de faire une poussée,
- Ralentir l'évolution de la maladie.

## Comment est-il administré ?

---

**Une première dose** de 600 mg est administrée en **2 perfusions intraveineuses** de 300 mg chacune, **en milieu hospitalier** (durant environ 2 heures et demie), **à 2 semaines d'intervalle**.

**Les doses suivantes**, de 600 mg, sont administrées en une perfusion unique (durant environ 3 heures et demie), **tous les 6 mois**.

## Que faire avant l'instauration du traitement ?

---

Votre neurologue s'assurera de :

- L'absence d'une **infection active**,
- L'absence d'un **déficit immunitaire**,
- L'absence d'une **grossesse**.

Il vérifiera si vous disposez d'une **IRM** récente du cerveau plus éventuellement de la moelle épinière.

Il vérifiera vos vaccins :

- Vaccination antipneumococcique et antigrippale très fortement recommandées,
- Vaccination contre la varicelle zona virus et hépatite B très fortement recommandées chez les patients non immunisés et à risque de contamination.

Si un vaccin est requis, voici **les délais à respecter avant de débiter l'Ocrevus®** :

- **Grippe : pas de délai minimum**
- **Pneumocoque : 1<sup>ère</sup> injection au moins 2 semaines avant la première perfusion ; 2<sup>ème</sup> injection 4 semaines avant la prochaine cure semestrielle d'Ocrévus®.**
- **Hépatite B : un schéma rapide peut être proposé (J0, J7, J21) à terminer au moins 2 semaines avant la première perfusion. Penser au rappel à M12 (4 semaines avant une perfusion d'Ocrévus®)**
- **VZV : contre-indiqué sous immunosuppresseur, 2 injections espacées de 4 à 8 semaines à réaliser au moins 4 semaines avant la première perfusion d'Ocrévus®.**

## Contre-indications

---

Le traitement doit être **évit** pendant la grossesse.

Les femmes en âge de procréer doivent utiliser une **contraception pendant le traitement**.

**En cas de projet de grossesse, parlez-en avec votre neurologue.**

**L'allaitement est déconseillé** pendant le traitement.



## Juste avant le traitement

---

**Précaution d'emploi** : Il ne faut pas prendre de traitement contre l'hypertension artérielle dans les 12 heures précédant la perfusion.

## Le jour du traitement

---

L'instauration du traitement dure environ **5 heures**.

30 à 60 minutes avant chaque perfusion, des corticoïdes et des antihistaminiques vous seront administrés pour limiter les effets indésirables associés à la perfusion.

Il ne vous sera plus possible de sortir de la chambre à partir du début du traitement.

Vous devez :

- Prévoir de quoi vous occuper (lire, tricoter, jouer...) pour la journée,
- Demander un patch de nicotine si vous êtes un « gros » fumeur.

À la fin de la perfusion, vous resterez **une heure en surveillance**.

Pendant la perfusion et pendant l'heure qui suit, **vos constantes seront régulièrement contrôlées** : tension artérielle, pouls et température toutes les 30 minutes.

## Quels sont les effets indésirables éventuels ?

---

**Des réactions associées à la perfusion**, plus fréquentes lors de la 1<sup>ère</sup> perfusion, d'intensité le plus souvent modérée :

- Réactions cutanées (démangeaisons, rougeurs...),
- Gènes au niveau de la gorge,
- Essoufflement,
- Fièvre,
- Nausées.

N'hésitez pas à signaler ces effets à l'infirmière lors de ses passages toutes les 30 minutes.

En cas d'effets secondaires, la vitesse de perfusion peut être diminuée. Prévoir des affaires personnelles pour la nuit si besoin.

**Ces réactions peuvent survenir dans les 24 heures suivant la perfusion.**

## Quelle surveillance entre les cures ?

---

**Une prise de sang avant chaque cure.**

Si vous présentez **des signes d'infection**, consultez votre médecin.

*Ce document est rédigé dans un but pédagogique, avec un langage accessible à tous, pour mémoriser les principales caractéristiques du médicament.*

*Pour une information complète se reporter à la fiche RCP (Résumé des Caractéristiques du Produit) ou au site internet : <http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/>*

*Cette plaquette a été mise à jour en mai 2023.*