

Sclérose en plaques

Traitement par MEDROL® 100 mg

(Méthylprednisolone - Pfizer)

Disponible en France depuis 2006



ASSOCIATION
Neuro-Bretagne

Cette plaquette a été réalisée par la filière SEP de

Dans quel cas le MEDROL® est-il utilisé ?

Le MEDROL® (corticoïdes) est utilisé chez les patients atteints de sclérose en plaques, lors d'une poussée, pour diminuer la durée et l'intensité de celle-ci. C'est une prescription médicale réservée aux médecins hospitaliers.

Qu'est qu'une poussée ?

Une poussée se caractérise par l'apparition ou la réapparition de signes neurologiques préexistants (en l'absence de fièvre) depuis au moins 24 heures consécutifs.

Comment la traiter ?

Votre neurologue vous prescrits **1g de MEDROL par jour pendant 3 jours**. **10 comprimés** à prendre en une prise, de préférence le matin.



Que faire avant l'instauration du traitement ?

Votre neurologue s'assurera de :

- L'absence de troubles rénaux, hépatique, glycémique... (grâce à une prise de sang).
- L'absence de troubles cardiaques (électrocardiogramme).
- L'absence d'infection urinaire (bandelette urinaire).
- Prévenir votre pharmacie : ce traitement, rarement en stock, est à commander.

Quels sont les effets indésirables éventuels ?

- **Troubles du sommeil :**

Les corticoïdes peuvent être responsables d'insomnie, d'excitation, de confusion. Il est donc préférable de prendre les comprimés le matin au cours du petit déjeuner. Ces symptômes disparaissent à l'arrêt du traitement. Un somnifère peut vous être prescrit par votre médecin.

- **Troubles gastriques :**

Vous pouvez ressentir des brûlures d'estomac. Dans ce cas, votre neurologue ou votre médecin traitant peut vous prescrire un médicament adapté (protecteur gastrique). N'hésitez pas à signaler en cas d'antécédents d'ulcère, gastrite ou douleurs d'estomac.

- **Hypokaliémie :**

Le taux de potassium dans le sang peut diminuer. Votre neurologue peut vous prescrire un médicament contenant du potassium pour prévenir cette baisse : cela dépendra de votre prise de sang initiale.

- **Hyperglycémie :**

Votre taux de sucre dans le sang peut augmenter. Il peut vous être recommandé de suivre un régime peu sucré pendant la durée préconisée par votre neurologue.

- **Sensation de goût métallique dans la bouche**

Conseil : vous pouvez boire de l'eau citronnée avant la prise alimentaire ce qui permet d'enlever « le mauvais goût » en bouche. Vous pouvez aussi privilégier les produits laitiers et les préparations de type quiches, quenelles, crêpes fourrées..., à base de béchamel.

Quelle surveillance ?

- Consulter votre médecin traitant en cas d'effet secondaire inhabituel.

Ce document est rédigé dans un but pédagogique, avec un langage accessible à tous, pour mémoriser les principales caractéristiques du médicament.

Pour une information complète se reporter à la fiche RCP (Résumé des Caractéristiques du Produit) ou au site internet : <http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/>

Cette plaquette a été mise à jour en mai 2020.