

Sclérose en plaques

Traitement COPAXONE® 40 mg

(Acétate Glatiramère - TEVA)

Disponible en France depuis 2017

2004 pour le dosage 20 mg



Cette plaquette a été réalisée par la filière SEP de

ASSOCIATION
Neuro-Bretagne

Dans quel cas la COPAXONE® est-elle utilisée ?

La COPAXONE® est utilisée chez les patients atteints de sclérose en plaques de forme rémittente (évoluant par poussée).

Comment est-elle conservée ?

Au réfrigérateur entre 2 à 8°C mais peut également se conserver à température ambiante pendant 30 jours si la température n'excède pas 25°C. Ne pas oublier de sortir le traitement du réfrigérateur **minimum 30 minutes avant l'injection**.

Comment agit-elle ?

La COPAXONE® est un agent immunomodulateur.

Les immunomodulateurs modifient la façon dont le système de défense de notre corps fonctionne. La COPAXONE® agit en modifiant les propriétés du système immunitaire pour réduire ses effets nuisibles sur la gaine de myéline et donc diminuer le nombre de poussées et l'évolution de la maladie.

Ce traitement est compatible avec une grossesse et un allaitement.

Comment est-elle administrée ?

Une injection sous cutanée 3 fois par semaine.

Espacer chaque injection d'au moins 48 h.

Exemple de semaine type : lundi-mercredi-vendredi

Que faire avant l'instauration du traitement ?

Votre neurologue s'assurera de :

- La mise à jour du calendrier vaccinal,
- L'initiation du traitement par une infirmière d'éducation ou, si elle n'est pas disponible, par une infirmière à domicile.

Quels sont les effets indésirables éventuels ?

- Sensation de malaise post injection (dans les 30 minutes),
- Réaction cutanée (rougeur, douleur au site d'injection...).

Quelle surveillance ?

- Surveillance cutanée des sites d'injections.

Que faire en cas d'oubli ?

En cas d'oubli d'une prise, faites l'injection dès que vous vous en rendez compte, **dans un délai maximum de 72 h.**


Schéma des différents sites d'injection

Il existe plusieurs sites d'injection possible :

- L'abdomen,
- Les deux cuisses,
- L'arrière des deux bras,
- Le haut des fesses

Vous pouvez alterner les sites d'une injection à l'autre.

Sites d'injection



Ce document est rédigé dans un but pédagogique, avec un langage accessible à tous, pour mémoriser les principales caractéristiques du médicament.

Pour une information complète se reporter à la fiche RCP (Résumé des Caractéristiques du Produit) ou au site internet : <http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/>

Cette plaquette a été mise à jour en mai 2020.